

Vĩnh Lợi, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**THÔNG TIN THUỐC**  
**Tháng 01/2026**

**1/ Oxybutynin**

- **Thông tin chung:** Thuốc Oxybutynin 5mg là thuốc chống co thắt, dùng điều trị các triệu chứng bàng quang hoạt động quá mức như tiểu không tự chủ, tiểu gấp, tiểu nhiều lần ở người lớn và trẻ em trên 5 tuổi, hoặc các rối loạn chức năng bàng quang do thần kinh, thuốc hoạt động bằng cách làm giảm co thắt cơ bàng quang, giúp tăng dung tích bàng quang và giảm cảm giác buồn tiểu khẩn cấp.

- **Chỉ định**

Tiểu tiện không tự chủ, tiểu tiện quá nhiều lần, tiểu tiện gấp, đái dầm do bàng quang co thắt quá mức ở trẻ trên 5 tuổi...

- **Chống chỉ định**

Glôcôm góc đóng, trẻ em dưới 6 tuổi...

- **Thời gian dùng, cách dùng, liều dùng**

Uống thuốc và cùng một thời điểm mỗi ngày, khởi đầu 5mg/ lần, 2-3 lần/ ngày, tối đa 5mg/lần 4 lần/ ngày

Lưu ý: Bệnh tiền liệt tuyến lành tính là bệnh mãn tính, do đó thuốc có thể dùng liên tục kéo dài theo các tài liệu không có thời gian cụ thể để kết thúc dùng thuốc nhưng cần lưu ý thuốc có tác dụng phụ bằng 1/5 Atropin thời gian dài dùng thuốc sẽ có hoa mắt chóng mặt, khó ngủ..., tùy trường hợp bác sĩ kê đơn cần nhắc thêm hoặc giảm liều đảm bảo không vượt quá liều tối đa

**Tài liệu tham khảo**

Dược thư Quốc gia Việt nam năm 2022

**2/ Tamsulosin**

- **Thông tin chung:** Tamsulosin là thuốc chẹn alpha 1-adrenergic, dùng cho nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH), giúp giãn cơ trơn tuyến tiền liệt và cổ bàng quang, làm giảm các triệu chứng khó tiểu như tiểu nhiều, tiểu đêm, tia nước tiểu yếu, nhờ đó cải thiện lưu thông nước tiểu. Thuốc được dùng đường uống, dạng viên/nang, uống nguyên viên.

- **Chỉ định**

Điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt

- **Chống chỉ định**

Tiền sử hạ huyết áp thể đứng, suy gan nặng...

- **Thời gian dùng, cách dùng, liều dùng**

Uống sau bữa ăn 30 phút, nuốt nguyên viên, liều dùng 0,4 mg một lần/ ngày tối đa 0,8 mg một lần/ngày

(Không có quy định uống vào buổi sáng hay buổi tối)

Nuốt viên thuốc nguyên vẹn, không được mở (đối với dạng viên nang), nhai hoặc nghiền nát viên thuốc.


Lưu ý: Bệnh tiền liệt tuyến lành tính là bệnh mãn tính, do đó thuốc có thể dùng liên tục kéo dài, theo các tài liệu không có thời gian cụ thể để kết thúc dùng thuốc nhưng cần lưu ý thuốc có tác dụng phụ của nhóm chẹn Alpha 1-adrenergic (nhìn mờ, khó thở, đau khớp, đỏ mắt, đỏ mũi, tức ngực...) thời gian dài dùng thuốc sẽ có nhìn mờ, khó thở, đỏ mũi, tức ngực..., tùy trường hợp bác sĩ kê đơn cần nhắc thêm hoặc giảm liều đảm bảo không vượt quá liều tối đa.

#### Tài liệu tham khảo

Hướng dẫn sử dụng thuốc từ nhà sản xuất SYNTHON HISPANIA, S.L (Tây ban Nha)/sản phẩm FLOEZY

#### \*Các ý kiến đóng góp gửi về:

- Khoa Dược - TTB - VTYT, Tổ dược lâm sàng - Thông tin thuốc
- Zalo nhóm: duoclamsang TTYT Vinh Loi2022-2023-2024
- Gmail: [khoaduoc.benhvien.vinhloi@gmail.com](mailto:khoaduoc.benhvien.vinhloi@gmail.com).



**NGƯỜI VIẾT THÔNG TIN**

Lưu Thị Minh

#### Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Bác sĩ, các khoa, phòng lâm sàng, TYT xã, thị trấn;
- Các dược sĩ lâm sàng;
- Lưu: Tổ DLS-TTT.